

Conseils - Après suture - H-JU

Auteurs : Thaïs Chappuis, Hélène Laval



QUE FAIRE ?



- Garder la plaie propre et sèche.
- Ablation des fils auprès du (des) médecin(s) défini(s) lors de la consultation aux Urgences dans :
 - 5-6 jours pour une plaie du visage.
 - 10 jours pour une plaie du cuir chevelu.
 - Ou selon recommandation du médecin.

Si l'enfant a des douleurs, donner un médicament pour la douleur selon l'ordonnance.

En cas de traumatisme crânien, ne jamais donner d'anti-inflammatoire (Algifor[®], Irfen[®], Mefenacid[®]).

QUE SURVEILLER ?

Surveiller les signes d'inflammation de la plaie, si un ou plusieurs de ces signes apparaissent, consulter votre médecin et surveiller la température matin et soir :

- Rougeur
- Douleur
- Chaleur
- Écoulement anormal

QUAND CONSULTER SON PEDIATRE ?

En cas d'apparition d'un saignement, d'un écoulement accompagné de douleur, d'une rougeur autour de la plaie, de fièvre, si la plaie s'ouvre (lors de lâchage d'un ou plusieurs points) ou pour toutes autres questions, prenez contact avec votre médecin traitant ou venez aux Urgences de pédiatrie.

Durant un an, protéger la cicatrice du soleil à l'aide d'une crème solaire de type écran total et d'un chapeau.

